

NILOCIN®VÅRTPENNA

Vägledning:

Det rekommenderas att vårtan blötgörs i ljummet vatten i minst 5 minuter innan behandling. Ifall vårtan är täckt av hårt hud, kan vårtan försiktigt skapas på ovensidan. Den hårda huden på ovensidan avlägnas försiktigt. Fila inte på vårtan. Barn bör behandlas av en vuxen.

- 1) Avlägsna korken från Nilocin Vårtpenna.
- 2) Massera försiktigt vårtan med tippen av pennan i 20 sekunder. Behandlingen tränger därmed ner i vårtan. Hela ovensidan av vårtan ska behandlas. Undgå kontakt med huden som finns vid vårtan. Korken på pennan sätts på direkt efter användning, för att undvika att pennan torkar ut.
- 3) Behandla vårtan 3 gånger per vecka, i upp till sex veckor. Behandlingen sker varannan dag, därefter rekommenderas en två dagars paus, efter den kan behandlingscyklen återtas, tills vårtan är avlägsnad.

Det rekommenderade antalet applikationer bör inte överskridas.

Nilocin Vårtpenna utsöndrar en liten mängd av en färglös frätande vätska. Om du är i tvivel på om pennan är torr, så pressas pennans tipp lite lätt mot ett absorberande papper, och det framkommer då ett litet vått märke.

Uppstår det obehag eller smärta ska appliceringen stoppas. Uppstår det sveda eller en brännande känsla vid applicering, eller om det i samband med en olycka råkat applicerats medel på vårtans omgivande hud, sköljs huden av med kallt vatten.

Produkten förvaras i sin originalförpackning, vid 2-25°C, undvik att bevara produkten i direkt solljus, och produkten ska bevaras utom räckhåll för barn. Produkten får inte användas efter utgångsdatumet, eller sex månader efter att produkten öppnats. Efter användning ska pennans kork sättas på ordentligt, för att undvika att pennan torkar ut. Produkten återvinns som farligt avfall.

Förhållningsregler:

Enbart för utvärtes bruk. Ska bevaras utom räckhåll för barn. Produkten innehåller ett frätande medel, som har en stark lukt, inhalera inte.

- Använd inte Nilocin för behandling av könsvårtor eller för vårtor i ansiktsregionen.
- Undvik att använda Nilocin, om du är känslig för innehållet, eller som du är överkänslig för bi- och myggstick.
- Undgå kontakt med den friske huden, runt vårtan.
- Utsätt inte det behandlade området för solljus, så länge som behandlingen pågår.
- Använd inte på blödande eller ömma vårtor, blåsor eller irriterad, inflammerad och skadad hud. Håll paus mellan behandlingarna intill huden har blivit restaurerad.
- Använd inte på vårtor med hår, modermärken, pigmenterad hud, eller i tillfälle att du är i tvivel om att hudens tillstånd är en vårta.
- Extra försiktighet bör ske, när behandlingen sker på tunn eller känslig hud, eller i samband med att barn eller diabetiker behandlas.
- Det är bättre att applicera för lite mängd produkt, än för mycket, för att undgå sår, blåsor, inflammationer, vävnadsdöd eller kemiska reaktioner.

- Överskrid inte antalet av rekommenderade applikationer.
- Konsultera läkare, om det behandlade området blir rött, smärtpåverkat eller irriterat.
- Vid en enkel patient, kan det användas vid flera tillfällen.
- Använd inte Nilocin i kombination av andra vårtbehandlingar.
- Använd inte på barn under 4 år, med mindre att det är ordinerat av en läkare.

OM PRODUKTEN VID EN OLYCKA HAMNAR I ÖGONEN, SKA ÖGONEN SKÖLJAS DIREKT MED RIKLIGA MÄNGDER VATTEN, UPPREPA IGEN EFTER 15 MINUTER. TA KONTAKT MED LÄKARE ELLER ALARMCENTRAL.

Biverkningar:

Det är viktigt att produkten används som ordinerat. Antalet av applikationer bör inte överskridas, då det kan medföra hudskador (se inläggssedeln). En svidande eller brännande känsla kan uppstå efter 10-15 minuter efter applicering. Vid överexponering kan det uppstå temporära biverkningar, som t.ex. en stickande känsla i huden, rödhet i huden, smärta eller blödningar. Stoppa isåfall med att använda produkten, tills huden är läkt.

Där finns inga kända biverkningar för gravida och ammande.

Allvarliga händelser bör förmedlas till Unigroup eller annan relevant myndighet.

Teknisk Data:

Inkluderar: 3 ml. Vårtpenna samt en inläggssedel.

Ingredienser (INCI): Formic acid, (85%) Dimethyl isosorbide, Aqua, Caprylic acid, Origanum vulgare leaf extract.

Varunr.: 101034

Registrering: Medicinskt utstyr, klass IIa. Nilocin Vårtpenna är klassificerat som medicinskt utstyr och har genomgått ett kvalitetsstyrningssystem i överensstämmelse med ISO 13:485.

Sida 2 av 2 sidor